



GROUPE
VIDYMED

URGENCES PÉDIATRIQUES



MORSURE DE TIQUE

Informations destinées aux parents



GROUPE
VIDYMED

 **swiss** 
olympic

Medical
Center

Si votre enfant a été mordu par une tique, il n'est pas obligatoire dans un premier temps de consulter un médecin.

PRÉVENTION PRIMAIRE DE LA MALADIE DE LYME

La meilleure prévention primaire actuelle consiste à se **protéger contre les morsures de tiques lors d'une promenade en forêt** :



Port de vêtements **longs et fermés**, de couleur **claire** pour repérer plus facilement les tiques.



Examen soigneux de tout le corps et du cuir chevelu après la promenade pour repérer et retirer précocement toutes tiques.

PRÉVENTION SECONDAIRE : RETRAIT PRÉCOCE DE LA TIQUE



Retirer au plus vite et doucement la tique avec une pincette en la saisissant **au plus près de la peau**, puis **désinfecter**. Ne pas utiliser d'éther, d'huile ou tout autre produit avant d'extraire la tique.



S'il reste un morceau (petit point noir) ne pas s'efforcer de l'enlever, il partira par lui-même, désinfecter simplement la plaie.




Dans les 3 à 30 jours : **surveiller l'apparition d'une plaque rouge** (EM : érythème migrant) sur le site de la piqûre, ou ailleurs sur le corps, d'un diamètre supérieur à 5 cm, de douleurs articulaires ou musculaires inexplicables, de fièvre ou d'une fatigue inhabituelle. **Si c'est le cas, consulter votre médecin.**

La présence d'une petite zone d'érythème autour de la piqûre immédiatement ou dans les 24 premières heures après la morsure est le résultat d'une réaction aux composés salivaires de la tique et ne doit pas être confondue avec un érythème migrant.

En cas d'urgences vitales, appelez le 144.

Groupe Vidymed
Centre médical de Vidy



Centre d'urgences pédiatriques

Route de Chavannes 11
1007 Lausanne
T +41 21 622 88 88

info@vidymed.ch
www.vidymed.ch